**PCT** 

#### WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

C12N 15/87, C07K 14/02, C12N 15/36, 15/86, A61K 48/00, 47/48

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 95/06745

**A1** 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

9. März 1995 (09.03.95)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE94/01003

(22) Internationales Anmeldedatum: 24. August 1994 (24.08.94)

(81) Bestimmungsstaaten: CA, JP, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten:

P 43 29 811.7 P 43 39 922.3

3. September 1993 (03.09.93) DE

19. November 1993 (19.11.93) DE Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

- MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT **ZUR** (71) Anmelder: FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V. [DE/DE]; Hofgartenstrasse 2, D-80539 München (DE).
- (72) Erfinder: STRAUSS, Michael; Parkstrasse 3, D-13187 Berlin (DE). SANDIG, Volker; Robert-Rössle-Strasse 10, D-13125 Berlin (DE). HOFMANN, Christian; Robert-Rössle-Strasse 10, D-13125 Berlin (DE).
- (74) Anwalt: BAUMBACH, Fritz; BioTeZ Berlin-Buch GmbH, Patentstelle, Robert-Rössle-Strasse 10, D-13125 Berlin (DE).
- (54) Title: VECTOR FOR GENE THERAPY OF THE LIVER
- (54) Bezeichnung: VEKTOR FÜR LEBER-GENTHERAPIE

#### (57) Abstract

A liver-specific, gene therapy vector finds applications in medicine and genetic engineering. The object of the invention is to develop vector that finds liver cells with high specificity, is effectively absorbed by the cells and may inject the imported therapeutic genes into the cell nucleus. The vector should be suitable for the gene therapy of human beings. The vector according to the invention is characterised in that a therapeutic gene coupled to a promoter is packed in a polypeptide sheath and coupled to components of hepatitis B virus.

#### (57) Zusammenfassung

Die Ersindung betrifft einen Vektor für die leberspezisische Gentherapie; Anwendungsgebiete sind die Medizin und die Gentechnik. Ziel der Erfindung ist die Konstruktion eines Vektors, der Leberzellen hochspezifisch findet, von den Zellen effektiv aufgenommen wird und eingebrachte therapeutische Gene in den Zellkern einschleusen kann. Der Vektor soll für die Gentherapie beim Menschen einsetzbar sein. Der erfindungsgemäße Vektor ist dadurch gekennzeichnet, daß ein therapeutisches, an einem Promotor gekoppeltes Gen mit einer Polypeptidhülle verpackt und an Komponenten des Hepatitis-B-Virus gekoppelt wird.

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT Österreich AU Anstralien BB Barbados BE Belgien BF Burkina Paso BG Bulgarien BJ Benia BR Brasilien BY Belarus CA Kanada CF Zentrale Afrikanische Republik CG Kongo CH Schweiz CI Côte d'Ivoire CM Kamerus CN China CS Tachechoslowakei CZ Tachechische Republik DE Deutschland DK Dänemark ES Spanien FI Finnland FR Prankreich	GA Gabon GB Vereinigtes Königreich GE Georgien GN Guinea GR Griechenland HU Ungarn IE Irland IT Italien JP Iapan KE Kenya KG Kirgisistan KP Demokratische Volksrepublik KR Republik Korea KZ Kasachstan LI Liechtenstein LK Sri Lanka LU Luxemburg LV Lettland MC Monaco MD Republik Moklan MG Madagaskar MIL Mali MN Mongolei	MR Mainetanien MW Malawi NE Niger NL Niederlande NO Norwegen NZ Neuseeland PL Polen PT Portugal RO Rumanien RU Russische Föderation SD Sudan SE Schweden SI Slowenien SK Slowakei SN Senegal TD Tachad TG Togo TJ Tadschikistan TT Trinidad und Tobago UA Ukraine US Vereinigte Staaten von Amerika UZ Usbekistan VN Vietnam
--	--	--

Vektor für Leber-Gentherapie

#### Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Vektor für die leberspezifische Gentherapie; Anwendungsgebiete sind die Medizin und die Gentechnik.

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Methoden und Vektoren für die Gentherapie entwickelt worden (Übersicht in Mulligan /1993/ Science 260, 926). Dabei werden viele Vektoren, vor allem solche, die von Retroviren oder Adenoviren abgeleitet sind, favorisiert. Beide Virus-Vektortypen sind relativ breit anwendbar, wobei retrovirale Vektoren nur bei teilungsfähigen Zellen effektiv sind und Adenoviren auch bei ruhenden Zellen funktionieren. Beide Vektortypen sind zwar für die Genübertragung in Leberzellen (Hepatozyten) in vitro geeignet, können aber für eine in vivo Anwendung zur Gentherapie beim Menschen kaum in Betracht gezogen werden. Während für die Anwendung retroviraler Vektoren eine Leberteilresektion zur Stimulierung von Zellteilung (Regeneration) erforderlich wird, ist der adenovirale Gentransfer nicht sehr stabil (keine Integration in das Genom).

Alternative Vektoren mit potentieller Anwendbarkeit für den Lebergentransfer basieren auf Liposomen oder auch auf Multikomponenten-Partikeln mit Proteindomänen, die spezifisch an bestimmte Rezeptoren der Leber (z.B. Asialoglykoprotein-Rezeptor) binden und durch deren Internalisierung in die Zelle aufgenommen werden können (Übersicht in: Versland et al /1992/Seminors in Liver Disease 12, 332). Ein wesentlicher Nachteil dieser Vektoren besteht in der Aufnahme über den endozytokischen Weg, der zu einer Degration eines großen Teils der Vektoren und ihrer DNA in den Endosomen führt, so daß nur wenig funktionsfähige DNA den Zellkern erreichen kann.

Eine Lösung für dieses Problem wurde zwar für die in vitro Anwendung gefunden; diese ist aber nicht auf die Situation in vivo (am Patienten) anwendbar. Sie basiert auf der gleichzeitigen Infektion der Zielzellen mit Adenovirus, was zur Auflösung der Endosomen und Freisetzung von Vektor (DNA) führt. (Curiel, D.T., Agrawal, S., Wagner, E. und Cotten, M. 1991, PNAS 88, 8850-8854).

Ziel der Erfindung ist die Konstruktion eines Vektors, der Leberzellen in vivo hochspezifisch findet, von den Zellen effektiv aufgenommen wird und eingebrachte therapeutische Gene in den Zellkern einschleusen kann. Der Vektor soll für die Gentherapie beim Menschen einsetzbar sein.

Die Erfindung wird gemäß Anspruch 1 realisiert, die Unteransprüche 2 - 9 sind Vorzugsvarianten.

Erfindungsgemäß wird ein therapeutisches Gen, das an einen Promoter gekoppelt ist, in eine Polypeptidhülle verpackt und mit Proteindomänen des HBV chemisch, enzymatisch oder über Antikörper gekoppelt. Als therapeutisches Gen wird die cDNA eines Gens verwendet, das bei der zu behandelten Krankheit defekt ist, d. h. fehlt oder durch Mutation verändert ist.

Beispiele für solche Gene sind das LDL-Rezeptor-Gen, dessen Fehlen die häufigste Stoffwechselerkrankung der Leber, die familiäre Hypercholesterinämie, verursacht, und das Alpha-1-Antitrypsin-Gen.

Als Promotoren dienen leberspezifische Promotoren, bevorzugt Promoter/Enhancer des Hepatitis-B-Virus wie z.B. die Kombinationen core-Promoter/ enhancer II. Sie sind neben ihrer Spezifität auch klein genug, um leicht in einen Expressionsvektor eingebaut werden zu können. Auch in Betracht für die Konstruktion des erfindungsgemäßen Vektors kommen Promotoren leberspezifischer Gene wie Albumin, PEPCK (Phosphoenolpyruvat-carboxykinase) oder OTC (Ornithintranscarbamylase).

Die für die Verpackung verwendete Polypeptidhülle besteht vorzugsweise aus chromosomalem Protein wie z. B. gereinigtem HMG1. Gleichermaßen geeignet sind auch andere DNA-bindende Proteine wie z. B. Protamine oder Hepatitis-core-Protein. Dieses Protein ist deshalb besonders geeignet, weil es außer seiner DNA-Bindungs- und DNA-Kondensationsfähigkeit eine natürliche Komponente des Hepatitis-B-Virus ist und deshalb den Einbau in Virushüllen begünstigt.

Die Polypeptidhülle kann gemäß der Erfindung auch aus Polyaminosäuren eines Typs basischer Aminosäuren hergestellt werden, wobei sich in erster Linie Poly-L-Lysin und Poly-L-Ornithin eignen.

2

Das erfindungsgemäß als gekoppelte Komponente eingesetzte partikuläre prä-S1/S-Protein des Hepatitis-B-Virus kann aus Virus-produzierenden Zellen isoliert werden. Prä-S1/S-Protein wird aber aus Sicherheitsgründen vorteilhafterweise gentechnisch hergestellt. Derartige Nukleinsäure-freie Partikel stellen von der äußeren Oberfläche gesehen eine vollständige Virushülle dar. Damit hat der resultierende Vektor eine hohe Homologie zum natürlichen Hepatitis-B-Virus und kann deshalb den Infektionsmechanismus nachvollziehen.

Anstelle der Verwendung der kompletten Virushüllproteine läßt sich die Erfindung auch mit Liposomen als Transportvehikeln realisieren. Dabei wird die Oberfläche der verwendeten Liposomen durch prä-S1/S-Protein so modifiziert, daß eine Aufnahme über Hepatitis-B-spezifischen Mechanismen möglich ist.

Die Herstellung der Vektoren erfolgt gemäß Anspruch 10, die Unteransprüche 11 - 13 sind Vorzugsvarianten. Ein vorteilhaftes Verfahren besteht z.B. darin, daß die Kopplung des in HMG1 verpackten Gens an prä-S/S1-Proteine des HBV kovalent mittels Transglutaminase-Reaktion erfolgt.

Der erfindungsgemäße Vektor ermöglicht, ein gewünschtes Gen in das Gewebe, insbesondere die Leber eines Patienten einzuführen und seinen Weg zum Funktionsort optimal zu gestalten. Das erfolgt beispielsweise dadurch, daß der Vektor konfektioniert und einem Patienten über die Blutbahn, vorzugsweise über die Portalvene der Leber, verabreicht wird. Mit der Erfindung wird eine wesentliche Voraussetzung für eine Therapie genetischer Erkrankungen der Leber geschaffen.

Die Erfindung soll nachfolgend durch ein Ausführungsbeispiel näher erläutert werden.

### Anwendungsbeispiel

# 1. Expression von HBV-Hüllproteinen in Insektenzellen

Die Hülle des HBV-Virus besteht aus drei Proteinen. Sie sind Translationsprodukte eines offenen Leserahmens im HBV-Genom'mit unterschiedlichen Initiationsstellen. Während das große Hüllprotein (L: P39, GP42) die Domänen Prä-S1, Prä-S2 und S enthält, besteht das mittlere (M: P33, GP36) aus Prä-S2 und S und das kleine Hüllprotein (S: P24, GP27) nur aus der Domäne S.

Die Gene des kleinen (S) und großen (L) HBV-Hüllproteins werden durch Amplifikation aus dem Genom des Hepatitis B Virus (Subtyp ayw) gewonnen. Für das L-Gen werden verschiedene Varianten erstellt, um die Sekretion des Proteins zu erleichtern. Sie kodieren für ein N-terminal verkürztes L-Protein (Deletion der Aminosäuren 1-6), ein L-Protein, dessen Myristilierungsort mutiert wird (Aminosäure 2 Gly-->Ala) bzw. eine Fusion mit der Mellitin-Signalsequenz.

Alle Gene werden einzeln in den Baculovirus-Transfervektor PVL941 (Pharmingen) kloniert und stehen unter Kontrolle des Polyhedrin-Promoters. Nachträglich wird ein DNA-Fragment, bestehend aus dem Polyhedrin-Promoter und dem S-Gen in alle Vektoren, die Varianten des L-Gens enthalten, derart eingefügt, daß beide Expressionseinheiten in gleicher Orientierung vorliegen und von Baculovirus-Sequenzen flankiert sind.

Die rekombinanten Plasmide und Baculovirus-DNA (BaculoGold, Pharmingen) werden mit Lipofectin in Spodoptera frugiperda-Zellen (Sf9) kotransfiziert. Durch homologe Rekombination zwischen Plasmid und Virus-DNA werden rekombinante Baculoviren erzeugt, welche die HBV-Hüllproteine unter Kontrolle des Polyhedrinpromoters in infizierten Sf9-Zellen expremieren. Die Synthese dieser Proteine wird im Westernblot nachgewiesen. Elektronenmikroskopisch wird gezeigt, daß die Hüllproteine zu Partikeln assoziieren.

Nach wiederholter Passagierung der Viren auf Sf9-Zellen werden Spinnerkulturen (109 Sf9-Zellen) infiziert. 72 Stunden nach Infektion werden die Zellen durch Sedimentation gewonnen und mittels Ultraschall aufgeschlossen. Nach Abtrennung von Membranen durch Sedimentation erfolgt die Reinigung der Hüllpartikel

wahlweise durch Zentifugation im CsCl-Dichtegradienten oder durch Affinitätschromatografie. Hierbei finden S-spezifische monoklonale Antikörper Anwendung.

#### 2. Expression und Reinigung von HMG1

Das Gen des Nichthistonproteins HMG1 der Ratte wird aus dem Vektor zur bakteriellen Expression pT7RNHMG1 [Bianchi, E., Gene, 104 (1991) 271-275] entnommen und in den Baculovirus-Transfervektor PVL941 kloniert. Rekombinante Baculoviren werden nach dem für HBV-Gene beschriebenen Verfahren erzeugt. Der Expressionsnachweis erfolgt durch Coomassiefärbung der Proteine nach SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese.

Zur Reinigung von Ratten-HMG1 aus infizierten Sf9-Zellen wird ein Zelllysat durch Aufschluß mit Ultraschall erzeugt, Membranen durch Sedimentation abgetrennt und das Lysat mit 2% TCA gefällt. Der Überstand wird anschließend einer Azetonfällung im sauren Milieu unterzogen. Das entstehende Präzipitat wird gelöst und durch Ionenaustauschchromatographie über eine Mono Q-Säule im Kochsalzgradient fraktioniert. Die bei 1,7M NaCl eluierte Fraktion enthält elektrophoretisch reines HMG1.

#### 3. Herstellung von DNA-HMG1-Komplexen

Nach Böttger et al. [Biochim. Biophys. Acta 950 (1988) 221-228] wird Plasmid-DNA der Form 3 sequenzunabhängig von HMG1 gebunden und kondensiert.

Die Bildung der DNA-Protein-Komplexe erfolgt durch schrittweise Zugabe eines zwanzigfachen Masseüberschusses an HMG1 zu einer DNA-Lösung von  $50\mu g/ml$  in 150mM NaCl 10mM Tris/HCl bei pH 8,0. DNA-Bindung und Kondensation werden durch Gelretardation und Sedimentation im Sacharosegradienten nachgewiesen.

#### 4. Bindung von DNA-HMG1-Komplexen an HBV-Partikel

HBV-Hüllproteine werden mittels Transglutaminase kovalent mit HMG1 vernetzt. In dieser Reaktion treten  $\epsilon$ -Aminogruppen der Lysine im HMG-Molekül als Acyl-Akzeptor und  $\gamma$ -Karboxamidgruppen der Glutaminreste im HBV-L und S-Protein als Acyldonor auf.

WO 95/06745

Die Reaktion wird 1h bei 37°C in 150mM NaCl, 10mM CaCl<sub>2</sub> 20mM Tris/HCl pH 8,0 mit 0,5 Einheiten Meerschweinchen-Transglutaminase bei einem Masseverhältnis von HMG1: HBVL+S = 10:1 durchgeführt.

5. Infektion primärer humaner Hepatozyten mit dem Gentransfervektor

Eine konfluente Monolayerkultur humaner Hepatozyten wird 5 Tage nach Anlage für 12 Stunden mit dem Transfervektor infiziert. Das Plasmid pBAG [Proc. Natl. Acad. Sci. 84 (1987) 156-160], das das Gen der B-Galaktosidase aus *E.coli* unter Kontrolle eines retroviralen LTR enthält, wird in den Vektor verpackt. Der Nachweis des Gentransfers erfolgt 48 Stunden nach Infektion durch den in situ-Enzymtest für B-Galaktosidase.

#### Patentansprüche

1. Vektor für die gewebespezifische Gentherapie, gekennzeichnet dadurch, daß ein therapeutisches Gen, das an einen Promoter gekoppelt ist, mit einer Polypeptidhülle verpackt und an Komponenten des Hepatitis B-Virus gekoppelt wird.

- 2. Vektor für die leberspezifische Gentherapie nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daß ein therapeutisches Gen, das an einen Promoter gekoppelt ist, mit einer Polypeptidhülle verpackt und an Komponenten des Hepatitis B-Virus gekoppelt wird.
- 3. Vektor nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet dadurch, daß als therapeutisches Gen die cDNA eines Gens verwendet wird, das bei der zu behandelnden Krankheit defekt ist.
- 4. Vektor nach Anspruch 1 bis 3, gekennzeichnet dadurch, daß als Promotor ein leberspezifischer Promoter, bevorzugt ein Promoter/Enhancer von Hepatitis B verwendet wird.
- 5. Vektor nach Anspruch 1 bis 4, gekennzeichnet dadurch, daß die Polypeptidhülle aus einem chromosomalen Protein, vorzugsweise aus gereinigtem HMG1, besteht.
- 6. Vektor nach Anspruch 1 bis 5, gekennzeichnet dadurch, daß die Polypeptidhülle aus core-Protein von von Hepatitis B besteht.
- 7. Vektor nach Anspruch 1 bis 5, gekennzeichnet dadurch, daß die Polypeptidhülle aus Polyaminosäuren eines Typs basischer Aminosäuren hergestellt wird.
- 8. Vektor nach Anspruch 1 bis 7, gekennzeichnet dadurch, daß als gekoppelte Komponente partikuläres prä-S1/S-Protein des Hepatitis B-Virus eingesetzt wird.

9. Vektor nach Anspruch 1 bis 8, gekennzeichnet dadurch, daß als gekoppelte Komponente Liposomen mit gebundenem prä-S1-Peptid eingesetzt werden.

- 10. Verfahren zur Herstellung des Vektors nach Anspruch 1 bis 9, gekennzeichnet dadurch, daß die Kopplung des verpackten Gens an die Komponente(n) des Hepatitis B-Virus chemisch, enzymatisch oder über Antikörper durchgeführt wird.
- 11. Verfahren zur Herstellung nach Anspruch 10, gekennzeichnet dadurch, daß die Kopplung mit einem bifunktionellen Linker, 3bevorzugt SPDP, durchgeführt wird.
- 12. Verfahren zur Herstellung nach Anspruch 10, gekennzeichnet dadurch, daß die Kopplung mit Transaminase durchgeführt wird.
- 13. Verfahren zur Herstellung nach Anspruch 10, gekennzeichnet dadurch, daß die Kopplung mit bispezifischen Antikörpern durchgeführt wird.
- 14. Verfahren zur Anwendung des Vektors nach Anspruch 1 bis 9, gekennzeichnet dadurch, daß der Vektor konfektioniert und einem Patienten über die Blutbahn, vorzugsweise über die Portalvene der Leber, verabreicht wird.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/DE 94/01003

A. CLASSII IPC 6	C12N15/87 C07K14/02 C12N15/3 A61K47/48	36 C12N15/86 A6:	1K48/0 <b>0</b>
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national class	ification and IPC	
	SEARCHED		·
Minimum do IPC 6	cumentation searched (classification system followed by classification sys	tion symbols)	
Documentati	on searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the field	is searched
		·	
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data ba	se and, where practical, search terms use	ed) .
		· .	
C DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
Category	Claudi of document, with manager was appropriate,		
Y	CELL, vol.46, 1986, CAMBRIDGE, NA US		1-7, 10-14
	pages 429 - 436 NEURATH A. R. ET AL. 'Identifica chemical synthesis of a host celbinding site on hepatitis B viru	1 receptor	
	see the whole document		
Y	JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY. vol.267, no.3, January 1992, BAL US pages 1953 - 1961 KURODA S. ET AL. 'Hepatitis B vi envelope L protein particles'	TIMORE, MD	1-7, 10-14
·	see the whole document		
		-/	
		•	
X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are lis	sted in annex.
* Special car	tegories of cited documents:	"I" later document published after the	international filing date
'A' docum	ent defining the general state of the art which is not kered to be of particular relevance	or priority date and not in conflicted to understand the principle invention	ct will the abblication our
E' earlier filing	document but published on or after the international date	"X" document of particular relevance campot be considered povel or ca involve an inventive step when the	unot be considered to
which citatio	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another in or other special reason (as specified) sent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	"Y" document of particular relevance cannot be considered to involve document is combined with one	; the claimed invention an inventive step when the or more other such docu-
other:	means ent published prior to the international filing date but	ments, such combination being of in the art.  "&" document member of the same p	
later t	han the priority date claimed actual completion of the international search	Date of mailing of the internation	
	4 November 1994	14-12- 1	394
Name and	mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Espen, J	•

**1** :

		PCT/DE 94/01003
(Continua	tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Relevant to claim No.
ategory *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	
		1-7,
Y	VACCINE,	10-14
	vol.7, 1989, GUILDFORD GB	
·	pages 60 - 68 YOUN B. W. ET AL. Purification and	
	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
	recombinant mammallan cell culture	
	see the whole document	
		1-7,
Y	DNA,	10-14
	vol.7, 1988	
	pages 417 - 422 PRICE P. M ET AL. 'Translational selection PRICE P. M ET AL. 'Translational selection	
	in the expression of the hepatitis B virus	·
	envelope proteins	
	see the whole document	
		1-7,
Y	BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA,	10-14
	vol.950, 1988	
	pages 221 - 228 BÖTTGER M. ET AL. 'Condensation of vector	
	nul by the chromosomal Druce in inva-	
	pacults in efficient transfection	
	cited in the application	
1	see the whole document	
1	A COURT FOR A COUNTY STEADSCHING	1-7,
Y	ARCHIV FÜR GESCHWULSTFORSCHUNG,	10-14
1	VOI.60, 1990	
ì	I EXTREM IT ALL TRANSPECTION DY	
1	DAIL Took protein HMGI COMDIEXES.	
	raising of efficiency and role of Sint	
1	topology'	
		1-7,
Y	JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, vol.267, no.16, 1992, BALTIMORE, MD US	10-14
	1 - 11402 - 114X4	
	L WILCOM J M FT AL 'A ROVEL MECHANISM 'V'	
	achieving transgene persistence in vivo	
	after somatic gene transfer into	
	henatocytes'	
	see the whole document	
	PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF	1-7,
Y	PROCEEDINGS OF THE MALIDIANE ADVISER.	10-14
	SCIENCES OF USA, vol.90, March 1993, WASHINGTON US	
	1 2122 - 212h	
1	CUDICITAND R .1 EL AL. DEPARTE SENO	
	the angle adoptivity enhancement of	
	1 mecontor-mediated dene delivery and	
	expression in primary nepatolytes	
1	see the whole document	
1		
1		
}		

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/DE 94/01003

Box I	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This inte	rnational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1.	Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:  Remark: Although Claim 14 is directed to a method for treatment of the human or animal body, the search has been carried out and based on the alleged effects of the compound/composition.
2.	Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
• •	
3.	Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
This Inte	rnational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
1.	As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2.	As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3.	As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. [	No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
ت ا	restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark	on Protest  The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.  No protest accompanied the payment of additional search fees.

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 94/01003

. KLASSIF	TZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C12N15/87 C07K14/02 C12N15/36 C12N15/86	A61K48/00
	A61K47/48	•
lach der Inte	rnationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK	
DECTER	CHIERTE GEBIETE	
lecherchiere IPK 6	er Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) C12N C07K A61K	
lecherchierte	e aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten	n Gebiete fallen
	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. ve	rwendete Suchbegriffe)
Während der	internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (***	
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Te	202
Y	CELL, Bd.46, 1986, CAMBRIDGE, NA US	1-7, 10-14
	Seiten 429 - 436 NEURATH A. R. ET AL. 'Identification and chemical synthesis of a host cell receptor binding site on hepatitis B virus' siehe das ganze Dokument	1-7, 10-14
Y	JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY., Bd.267, Nr.3, Januar 1992, BALTIMORE, MD US Soiten 1953 - 1961	1-7, 10-14
	KURODA S. ET AL. 'Hepatitis B virus envelope L protein particles' siehe das ganze Dokument	
	-/	
X w	eitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu  Siehe Anhang Patenti	
Besonde  A Vero aber  E älten	oder dem Phontatskalling oder dem Phontatskalling oder dem Phontatskalling offentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert.  Anneldung nicht kollidier Erfindung zugrundeliegen ist Erfindung zugrundeliegen ist Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von beschaften veröffentlichung veröffentlichung von beschaften veröffentlichung veröffentlichung veröffentlichung von beschaften veröffentlichung veröffen	die nach dem internationalen Anmeidedatum veröffentlicht worden ist und mit der rt, sondern mur zum Verständnis des der den Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden- onderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindur er Veröffentlichung nicht als neu oder auf
"L" Verö sche and soll sus "O" Verö	offentlichung, die geeignet ist, einen Phontatsinhparten einer erfinderischer Tätigkeit beinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer veröffentlichung von besteren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden veröffentlichung von besteren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden veröffentlichung von besteren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden veröffentlichung von besteren ist (wie kam nicht als auf erfinderischer Tätigkeit bei veröffentlichung von besteren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden verden, wenn die Veröffentlichung von besteren ist (wie verden, wenn die Veröffentlichung von besteren ist (wie verden, wenn die Veröffentlichung von besteren in Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden verden, wenn die Veröffentlichung von besteren ist (wie verden, wenn die veröffentlichung von bes	onderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindur erischer Tätigkeit beruhend betrachtet entlichung mit einer oder mehreren anderen r Kategorie in Verhindung gebracht wird und en Fachmann nabeliegend ist
'P' Verd	e Benutzung, eine Ausstehlung oder anneldedatum, aber nach "&" Veröffentlichung, die Mit beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	tglied derselben Patentfamilie ist nationalen Recherchenberichts
Datum d	24. November 1994	-12- 1994
Name u	md Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde  Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2  NL - 2280 HV Rijswijk	steter
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.  Fax: (+31-70) 340-3016  Espen, J	

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 94/01003

		PCT/DE 94/01003
	mg) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommen	nden Teile Betr. Anspruch Nr.
Y	VACCINE, Bd.7, 1989, GUILDFORD GB Seiten 60 - 68	1-7, 10-14
	YOUN B. W. ET AL. 'Purification and characterization of pre-S-containing hepatitis B surface antigens produced in recombinant mammalian cell culture' siehe das ganze Dokument	
<b>Y</b>	DNA, Bd.7, 1988	1-7, 10-14
	Seiten 417 - 422 PRICE P. M ET AL. 'Translational selection in the expression of the hepatitis B virus envelope proteins' siehe das ganze Dokument	
	BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA, Bd.950, 1988 Seiten 221 - 228	1-7, 10-14
	BÖTTGER M. ET AL. 'Condensation of vector DNA by the chromosomal protein HMG1 results in efficient transfection' in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument	
	ARCHIV FUR GESCHWULSTFORSCHUNG, Bd.60, 1990 Seiten 265 - 270 BÖTTGER M. ET AL. 'Transfection by DNA-nuclear protein HMG1 complexes: raising of efficiency and role of DNA	1-7, 10-14
	topology'	1-7,
	JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, Bd.267, Nr.16, 1992, BALTIMORE, MD US Seiten 11483 - 11489 WILSON J.M. ET AL. 'A novel mechanism for achieving transgene persistence in Vivo	10-i4
	after somatic gene transfer into hepatocytes' siehe das ganze Dokument	
•	PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, Bd.90, März 1993, WASHINGTON US Seiten 2122 - 2126 CHRISTIANO R. J. ET AL. 'Hepatic gene therapy: adenovirus enhancement of receptor-mediated gene delivery and	1-7, 10-14
•	expression in primary hepatocytes siehe das ganze Dokument	

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE94/01003

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Feld I	Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 1 auf Blatt 1)
Gemäl	Artikel 17(2)2) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:
. <u>X</u>	Ansprüche Nr. weil Sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich Bemerkung: Obwohl der Anspruch 14 sich auf ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen/tierischen Körpers bezieht, wurde die Recherche durchdes menschlichen/tierischen Körpers bezieht, wurde die Recherche durchgeführt und gründete sich auf die angeführten Wirkungen der Verbindung/Zusammensetzung.
2. [	Ansprüche Nr. weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, weil sie sich auf Teile der internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
3. [	Ansprüche Nr. weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.
C.14	II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)
	the second of th
1. [	Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche der internationalen Anmeldung.
2. [	Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtsertigt hätte, hat die Internationale Recherchenbehörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
3. [	Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche der internationalen Anmeldung, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.
4.	Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchengebühren zu entrichtet.
i	Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.